

MARCA GENUINA

25 AÑOS DE EXPERIENCIA



**ESPECIALISTAS
EN LA REDUCCIÓN
DE COSTES
ECONÓMICOS**

**PARA PROGRAMAS AVANZADOS
DE NUTRICIÓN ANIMAL**



Ap. Correos 141 - 08500 VIC (Barcelona) España
Tel. 93 888 77 80 - Fax. 93 812 21 28
Internet: www.serveram.com
E-mail: serveram@cambrabcn.es

GLOBAL NUTRITION

ESPECIALISTAS EN NUTRICIÓN ANIMAL

RALTEC

CALIDAD PROTEGIDA

NUEVO PRODUCTO REHIDRATANTE SUPREMO

REHIDRAMAX

EL REHIDRATANTE DE LAS TRES FUNCIONES, REHIDRATA, ALIMENTA Y REDUCE LOS PROBLEMAS ENTÉRICOS.

Desde años, hemos estudiado el Mercado Mundial del ternero LACTANTE, y también de algunos RUMIANTES, cuando son SEPARADOS de la MADRE e **ingieren grandes cantidades líquidas (LECHE)**.

En estas etapas de cambio, sufrirán **NUEVOS** transportes, manejos, alojamiento y alimentación, soportando además los cambios extremos de temperatura (**TOMANDO POCOS LÍQUIDOS**).

La mortalidad en esta etapa de cambio (los primeros 20 días) puede ser muy **ELEVADA**, sino tomamos precauciones **PREVENTIVAS**. (**RECUPERAR LOS LÍQUIDOS**).

Los animales podrían entrar en **SITUACIÓN NUTRICIONAL DEFICITARIA** cuyos principales desencadenantes pueden ser **DOS: HIPOTERMIA O DESHIDRATACIÓN**.

A) Cuando estamos en estación hibernal, con locales fríos y ambientes húmedos, el ternero adquiere un alto grado de **HIPOTERMIA**, que en fase 2 ó 3 puede significar la muerte.

B) En las estaciones de verano, o bien en situaciones que soporten continuas temperaturas sofocantes, los animales pueden perder entre un 20-30%, del 80% de líquidos de su masa **CORPORAL**, entrando en **DESHIDRATACIÓN EXTREMA**.

LA MORTALIDAD PUEDE SER MUY ACUSADA.

El producto **REHIDRAMAX**, resuelve estas anomalías **APORTANDO**, a los animales Lactantes, los elementos necesarios para que **RECUPEREN LOS ELECTROLITOS, PERDIDOS EN ESTA FASE ESTRESANTE**.

CUADROS DE APLICACIÓN (DOSIS PREVENTIVAS)

DOSIS RECOMENDADA PARA TERNEROS, NOVILLAS Y BÚFALOS

| | |
|--------------|---|
| 1° Día | 150 gr. REHIDRAMAX, por 1,5 litros de AGUA CALIENTE (2 veces al día) |
| 2° Día | 50 gr. REHIDRAMAX, por 1,5 litros de leche (2 veces al día) |
| 3° Día | 30 gr. REHIDRAMAX, por 1,5 litros de leche (2 veces al día) |
| 4° a 15 días | 5 gr. REHIDRAMAX, por 1,5 litros de leche (2 veces al día) |

A partir de los 10-15 días, ajustar dosis a las necesidades HÍDRICAS de los animales.

MUY IMPORTANTE



DOSIS RECOMENDADA PARA CORDEROS Y CABRITOS

| | |
|--------|---|
| 1° Día | suministrar REHIDRAMAX 10 gr. diarios con 1 litro de leche por animal |
| 2° Día | suministrar REHIDRAMAX 8 gr. diarios por 1 litro de leche por animal |
| 3° Día | suministrar REHIDRAMAX 8 gr. diarios por 1 litro de leche por animal |
| 4° Día | suministrar REHIDRAMAX 5 gr. diarios por 1 litro de leche por animal |

De 5 a 25 días suministrar REHIDRAMAX 2 gr. diarios por 1 litro de leche por animal.

MUY IMPORTANTE



RECOMENDACIONES:

EN CASOS DE ENTERITIS AGUDAS, SUPRIMIR LECHE Y ADAPTAR DOSIS DEL CUADRO.